BULLETIN OF BOTANICAL RESEARCH

第15卷 第4期 1995年 10月
Vol. 15 No. 4 Oct., 1995

# 中国隐子草属二新变种

李法曾 倪陈凯

# TWO NEW VARIETIES OF CLEISTOGENES FROM CHINA

Li Fa-zeng Ni Chen-Kai

〔摘 要〕 本文发表隐子草属 *Cleistogenes* 两新变种，即多枝隐子草 *C. caespitosa* Keng var. *ramosa* F. Z. Li et C. K. Ni. var. nov. 天目山隐子草 *C. ramiflora* Keng et C. P. Wang var. *tianmushanensis* F. Z. Li et C. K. Ni. var. nov.

**关键词** 隐子草属、多枝隐子草、天目山隐子草

**Key words** *Cleistogenes; C. caespitosa* var. *ramosa; C. ramiflora* var. *tianmushanensis*

1、**多枝隐子草** 新变种 图1

**Cleistogenes caespitosa** Keng var. **ramosa** F. Z. Li et C. K. Ni var. nov.

A typo differt culmis supra midium ramosis, paniculis angustissimis 3-5mm. latis, spiculis 5-6mm. longis 2-3-floribus, aristatis 1-3mm. logis, antheris cir. 1.8mm longis.

Shandong: Jiaonan Dazhushan, Chen Han-Bin 131 (Typus, Department of Biology, Shandong Normal University) 15. IX. 1979, Kunyushan collector not detail 18. IX. 1979.

本新变种与原变种的区别在于秆中部以上多分枝，圆锥花序极狭窄，宽3—5mm，小穗长5—6mm，含2—3花，芒长1—3mm，花药长1.8mm。

山东：胶南大珠山，陈汉斌131(模式，存山东师范大学生物系) 1979,9,15，昆仑山，采集人不详。

2、**天目山隐子草** 图2

本文作者单位：济南，山东师范大学生物系（Department of Biology, Shandong Normal University, Jinan 250014）。

1995年3月收到本文。

图1 多枝隐子草 Cleistogenes caespitosa Keng var. romosa F. Z. Li et C. K. Ni
1. 植株全形 2. 小穗 3. 花

图2 天目山隐子草 Cleistogenes ramiflora Keng et C. P. Wang var. tianmushanensis F. Z. Li et C. K. Ni
1. 植株全形 2. 小穗 3. 花 4. 颖片

**Cleistogenes ramiflora** Keng et C. P. Wang var. tianmushanensis F. Z. Li et C. K. Ni. var. nov.

A typo differt ligulis clialiformis, paniculis angustioribus 4－4.5cm. longis 1-－1.5cm. latis, glumis brevioribus primis 1.5－2mm. longis scandis 3－4mm. longis, antheris flavis cir. 2.5mm. longis.

Zhejiang: West Tianmushan, collector no detail, 11, IX. 1959. (typus, Department of Biology, Shandong Normal University)

本新变种与原变种的区别在于叶舌纤毛状、圆锥花序比较窄，长4—4.5cm，宽1—1.5cm，颖较短，第一颖长1.5－2mm，第二颖长3—4mm，花药黄色，长约2.5mm。

浙江：西天目山，采集人不详，1956,9,11(模式，存山东师范大学生物系)。